FICHA TECNICA - MEDICAMENTO MAGISTRAL

1. Nombre del producto	Fentolamina Mesilato 0.5%
2. Nombre Genérico	Fentolamina Mesilato 0.5% Solución Inyectable
3. Fórmula Cualicuantitativa	Cada ml de producto contiene: Fentolamina Mesilato 5 mg Excipientes c.s.p. 1 ml
4. Descripción del Producto	Líquido estéril, envasado en frasco vial transparente x 5 ml; Etiquetado como Medicamento Magistral de acuerdo a lo aprobado en la legislación vigente.
5. Indicaciones	Bloqueador de receptores alfa adrenérgicos. Para el tratamiento de crisis hipertensivas en caso de feocromocitoma durante la preparación preoperatoria y la manipulación quirúrgica. Profilaxis de necrosis cutáneas y formación de escaras cutáneas a consecuencia de la extravasación de noradrenalina.
6. Vía de administración	Intravenosa. Subcutánea.
7. Dosificación	Adultos: Tratamiento de crisis hipertensivas en caso de feocromocitoma: De 2 mg a 5 mg por IV, si es requerido, se puede repetir la dosis controlando la tensión arterial. Profilaxis de necrosis cutanea: De 5 mg a 10 mg en 10 ml de solución salina en un lapso de 12 horas en el lugar de la extravasación. Niños: Tratamiento de crisis hipertensivas en caso de feocromocitoma: De 0.05 mg a 0.1 mg /kg por IV cada 5 minutos, se puede repetir la dosis controlando la tensión arterial. Dosis máxima 5 mg. Profilaxis de necrosis cutanea: De 5 en 10 ml de solución salina y se aplica en un lapso de 12 horas en el lugar de la extravasación. No aplicar mas de 5 mg totales
8. Preparación para la administración	Si se requiere, se debe disolver previamente en suero fisiológico.
9. Advertencias	Puede presentar taquicardias, arritmias cardiacas. Usar con precaución con gastritis y úlcera peptica.
10. Efectos secundarios	Taquicardia inducida por el reflejo baro receptor y el sistema vegetativo.
11. Contraindicaciones	Hipersensibilidad a los ingredientes. Hipotensión. Antecedentes de infarto al miocardio. Insuficiencia coronaria. Angina de pecho. Otra afección cardiaca.
12. Interacciones	Con agentes causantes de la disminución de la tensión arterial, como agentes Beta no selectivos. Adrenalina.
13. Incompabilidades	Soluciones alcalinas
14. Reacciones adversas	Taquicardia. Vertigo. Trastornos cardiacos, Hipotensión ortostática. Hipotensión aguda. Congestión nasal. Nauseas, Vómito, Diarrea. Astenia
15. Precauciones	No administrar en pacientes con hipersensibilidad a sus ingredientes. Interrumpir el uso si se presenta reacciones adversas. No usar en el embarazo y en la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.
16. Almacenamiento	Debe mantenerse en su envase original, cerrado y protegido de la luz. Almacenarse a temperatura ambiente.
17. Bibliografía	Anmat.gov.ar. Boletines. (2011) Pediaccum.es. Farmacoe. (2016) Martindale. Guía completa de consulta farmacoterapéutica (2003)